

INFORMOVANÝ SÚHLAS A POUČENIE PACIENTA

s aplikáciou preparátu s obsahom Clostridium botulinum toxínu typu A
pre dočasnú redukciu vrások

Meno a priezvisko:		Rodné číslo:	
Adresa:			

Žiadam o injekčnú aplikáciu preparátu Vistabel od fi. Allergan do oblasti:	
--	--

v predpokladanom množstve ...j jednotiek (IU)

Clostridium botulinum toxín

aplikovaný injekčne do príslušného svalu, blokuje periférny cholinergný prenos na neuromuskulárnom spojení blokádou uvoľňovania acetylcholínu na presynaptickej membráne. Účinok toxínu zahŕňa počiatočný krok naviazania na presynaptickú nervovú membránu, druhotne nastáva krok začlenenia a nakoniec toxín zabráňuje uvoľneniu acetylcholínu a spôsobí dočasnú paralýzu, tzn. dočasné ochrnutie svalu.

Výsledkom je uvoľnenie svalového stiahnutia a následne čiastočné alebo úplné vypnutie mimických vrások.

Metóda sa využíva na obmedzenie pohyblivosti mimických svalov a dočasne (na 2-6 mesiacov) odstraňuje/redukuje mimické vrásky. Efekt metódy je individuálny, závisí na sile stiahnutia mimického svalu a rýchlosti odbúravania účinnej látky, obnova prenosu nervového vzruchu sa objavuje postupne, tak ako sa obnovuje prenos vzruchu na nervovom - svalovom spojení.

Kontraindikácie :

- neuromuskulárne ochorenia a poruchy (napr. myasthenia gravis,...)
- infekcia v mieste požadovanej aplikácie
- hypersenzitivita na niektorú zo zložiek podávaného preparátu
- tehotenstvo
- vek pod 18 rokov

Možné nežiaduce účinky:

- hypersenzitivita (alergia) - môže sa vyskytnúť v rôznych stupňoch - začervenanie a opuch v mieste aplikácie, sťažené dýchanie, anafylaktický šok
- zvýšené riziko zhoršenia neuromuskulárnych porúch, ak sa vyskytovali už pred aplikáciou preparátu
- dysphagia - sťažené prehĺtanie – môže sa vyskytnúť pri aplikácii preparátu do oblasti platyzmy (sval v oblasti krku)
- kardiovaskulárne poruchy, porúch srdcového rytmu, možný srdcový infarkt

Príležitostne boli pozorované alergické kožné reakcie. Nežiaducim účinkom môže byť aj ptóza (pokles) viečka. Pri malom množstve pacientov sa môže objaviť diplopia (dvojité videnie) alebo príznaky z rozšírenia paralytického efektu stredných tvárových svalov. Tieto nežiaduce účinky sa upravujú behom dvoch až štyroch týždňov. Bola zaznamenaná tiež keratitída (zápal rohovky) a vysychanie oka z dôvodu zníženého klipkania, z tohto dôvodu je treba používať ochranné kvapky k náhrade slz. Malé modriny a opuch viečka sa môžu tiež objaviť, sú však krátkodobé. Injekcie môžu byť spojené s pocitom pálenia, bolestivosť je individuálna. Môžu byť bolesti hlavy, slabosť svalov v tvári, červenkasté sfarbenie kože v mieste aplikácie, suchá koža, svrbenie, pocit sucha v ústach.

Potvrdzujem, že som nezatajil(a) žiadne závažné komplikácie zdravotného stavu (najmä myasthenia gravis, stavy spojené so svalovou ohabnutosťou, glaukóm, reakcia na botulotoxín v minulosti) a tento je v súčasnosti uspokojivý a stabilizovaný.

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol(a) oboznámený(á) s celkovou problematikou zákroku, ktorý som sa rozhodol(a) dobrovoľne a na vlastnú žiadosť podstúpiť.

Ďalej som si vedomý(á), že aj pri dodržaní pravidiel zo strany lekára a klienta nemôže byť požadovaný estetický výsledok stopercentne zaručený.

V Bratislave, dňa:

.....
Podpis pacienta