

Cieľom úpravy veľkosti prsníkov je dosiahnutie nového atraktívnejšieho vzhľadu prsníkov a odľahčenie záťaže krčnej a hrudníkovej chrbtice. Pri operácii sa súčasne vykonáva aj zdvihnutie a úprava tvaru (modelácia) prsníkov.

Horná veková hranica operácia nie je limitovaná, u pacientiek mladších ako 18 rokov sa nevykonáva. Operácia patrí medzi časté operačné zákroky estetickej chirurgie s rýchlym, efektným a dlhodobým výsledkom.

KONTRAINDIKÁCIE (U KOHO NEMÔŽE BYŤ OPERAČNÝ ZÁKROK VYKONANÝ) :

- pacientky so sonografickým vyšetrením eventuálne mamografiou s potvrdeným podozrením na nádorové ochorenie mliečnej žľazy.
- tehotenstvo
- kojenie
- poruchy zrážanlivosti krvi

PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA

- interné predoperačné vyšetrenie (EKG, RTG pľúc, vyšetrenie krvi);
- ultrasonografické eventuálne mamografické vyšetrenie prsníkov.

OPERÁCIA:

- Zárok je realizovaný v celkovej anestézii a trvá cca 3 hodiny.
- Počas operácie sú podávané antibiotiká, ktoré znižujú riziko infekcie. Rezy sú vykonané podľa zakreslenia tak, že výsledná jazvička môže zostať okolo dvorca prsníka + vertikálne smerom nadol k podprsníkovej ryhe alebo okolo dvorca prsníka + vertikálne smerom nadol + v podprsníkovej ryhe.
- Definitívne umiestnenie jaziev závisí od použitej operačnej techniky, ktorú Vám objasní plastický chirurg pri predoperačnej konzultácii.
- Ku koncu operácie sú zavedené drény (hadičky odvádzajúce prebytočnú krv), ktoré znižujú riziko pooperačného zakrvácania.
- Operácia je ukončená elastickou bandážou prsníkov prípadne naložením elastickej zdravotnej podprsenky.

POOPERAČNÉ OBDOBIE

- Pri nekomplikovanom priebehu druhý deň ráno po preväze pacientka odchádza domov.
- Prvá pooperačná kontrola je 14 dní po operácii.
- V prípade pacientiek, u ktorých by bolo potrebné do miesta bydliska cestovať na väčšiu vzdialenosť a nechcú cestovať, môžeme zabezpečiť za doplatok ďalšiu noc na lôžkovom oddelení.
- Pacientke je doma umožnená bežná fyzická aktivita.
- Elastickú zdravotnú podprsenku musí nosiť 4 - 6 týždňov.
- Stehy, ak je to potrebné, sa odstraňujú na 12. - 14. deň po operácii.
- Plná fyzická aktivita sa odporúča asi po 4 - 6 týždňoch od operácie
- Operačný výsledok sa dá považovať za definitívny asi 3 mesiace po operácii.

NEŠPECIFICKÉ KOMPLIKÁCIE :

- možnosť pooperačnej alergickej reakcie
- v prípade operačného zákroku v celkovej anestézii možný vznik cievnej trombózy (užívanie hormonálnej antikoncepcie a fajčenie zvyšuje riziko tejto komplikácie)
- možné pooperačné krvácanie
- možná pooperačná infekcia
- možná dehiscencia (roztvorenie) rany
- možný vznik hypertrofických (vypuklých) jaziev

Svojim podpisom potvrdzujem, že:

- súhlasím s realizáciou lekárskeho vyšetrenia a výkonov v rozsahu, v akom som bol/a poučený. Poučenie (F-A-013-1 PCH) bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre udelenie tohto súhlasu.
- súhlas dávam pri plnom vedomí a svojím podpisom potvrdzujem, že som právne spôsobilý samostatne sa rozhodovať bez akéhokoľvek obmedzenia mojej spôsobilosti na právne úkony a vôľová stránka mojej osobnosti nie je oslabená danosťou môjho zdravotného stavu a primerane zodpovedá mojej rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu.

V Bratislave, dňa:

.....

Podpis pacienta