

Cieľom zväčšenia prsníkov s využitím silikónových implantátov je dosiahnutie nového, atraktívnejšieho vzhľadu prsníkov.

### KONTRAINDIKÁCIE (U KOHO NEMÔŽE BYŤ OPERAČNÝ ZÁKROK VYKONANÝ):

- relatívna kontraindikácia : pacientky trpiace autoimúnnymi ochoreniami (napr. celiakia, lupienka, Crohnova choroba)
- absolútna kontraindikácia: pacientky so sonografickým vyšetrením event. mamografiou s potvrdeným podozrením na nádorové ochorenie mliečnej žľazy. Neschopnosť podstúpiť celkovú anestéziu.

### POTREBNÉ PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA:

- interné predoperačné vyšetrenie (EKG, RTG pľúc, vyšetrenie krvi)
- ultrasonografické event. mamografické vyšetrenie prsníkov

### PRSNÍKOVÉ IMPLANTÁTY:

- Veľkosť a tvar implantátu sú zvolené podľa želania pacientky s ohľadom na požadovaný výsledný tvar a veľkosť prsníkov. Je však potrebné rešpektovať určité zásady platné pre túto operačnú techniku. Definitívne rozhodnutie je preto úlohou plastického chirurga, ktorý predstavu pacientky sklbi s možným chirurgickým postupom tak, aby bol dosiahnutý čo najlepší pooperačný výsledok. Životnosť implantátov v súčasnosti nie je časovo obmedzená, výrobcovia odporúčajú výmenu po 10-15. rokoch

### OPERÁCIA:

- Zárok je realizovaný v celkovej anestézii a trvá cca 1,5 - 2 hodiny.
- Počas operácie aj po operácii sú podávané antibiotiká, ktoré znižujú riziko infekcie.
- Implantáty sa vkladajú z krátkych rezov (cca 5cm dlhých) umiestnených v podprsníkovej ryhe alebo okolo prsníkového dvorca. Najčastejšie je požívaný prístup z podprsníkovej ryhy.
- Umiestnenie implantátov môže byť pod mliečnu žľazu, alebo pod veľký prsný sval - o vhodnej metóde bude pacientka oboznámená plastickým chirurgom počas konzultácie.
- Ku koncu operácie sú zavedené drény (hadičky odvádzajúce prebytočnú krv), ktoré znižujú riziko pooperačného krvácania v oblasti implantátov.
- Operácia je ukončená elasticou bandážou prsníkov event. naložením elastickej zdravotnej podprsenky.

### POOPERAČNÉ OBDOBIE:

- Pri nekomplikovanom priebehu druhý deň ráno po preväze, pacientka odchádza domov.
- Elasticú zdravotnú podprsenku musí nosiť 4-6 týždňov. Pacientke je doma umožnená bežná fyzická aktivita.
- Plná fyzická aktivita sa odporúča asi po 4-6 týždňoch od operácie.
- Operačný výsledok sa dá považovať za definitívny asi 3 mesiace po operácii.

### NEŠPECIFICKÉ KOMPLIKÁCIE :

- možnosť peroperačnej alergickej reakcie
- možnosť pľúcnej embólie
- možné pooperačné krvácanie
- možná pooperačná infekcia
- možná dehiscencia (roztvorenie) rany
- možný vznik hypertrofických (vypuklých) jaziev
- zníženie až vymiznutie citlivosti v oblasti mamillárneho komplexu

### ŠPECIFICKÉ - ZNÁME RIZIKÁ PRI POUŽITÍ SILIKÓNOVÝCH PRSNÍKOVÝCH IMPLANTÁTOV:

Okrem celkových operačných rizík prináša chirurgia gélových prsníkových implantátov určité špecifické riziká, medzi ktoré patrí :

- ruptúra (prasknutie) implantátu
- kapsulárna kontraktúra
- zvrášťovanie a záhyby na povrchu implantátu.
- extrúzia (vylúčenie) implantátu
- ALCL - anaplastický veľkobunkový lymfóm
- nespokojnosť s kozmetickými výsledkami

Svojim podpisom potvrdzujem, že:

- súhlasím s realizáciou lekárskeho vyšetrenia a výkonov v rozsahu, v akom som bol/a poučený. Poučenie (F-A-013-1 PCH) bolo poskytnuté zrozumiteľne, ohľaduplne, bez nátlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa rozhodnúť pre udelenie tohto súhlasu.
- súhlas dávam pri plnom vedomí a svojím podpisom potvrdzujem, že som právne spôsobilý samostatne sa rozhodovať bez akéhokoľvek obmedzenia mojej spôsobilosti na právne úkony a vôľová stránka mojej osobnosti nie je oslabená danosťou môjho zdravotného stavu a primerane zodpovedá mojej rozumovej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu.

V Bratislave, dňa:

.....

Podpis pacienta